

4. táblázat:

A szója gyomirtására posztemergensen (állományban) alkalmazható gyomirtó szerek felhasználásával kapcsolatos tudnivalók

Hatóanyag	Készítmény	Engedélyezett dózis (a vastagon szedett készítményre vonatkozóan)	A szója mely fejlettségi állapotától, mely fejlettségi állapotáig használható?	Esetleges fitotoxicitási tünet szójánál (pl. helytelen használat esetén)	Korlátozás a szóját követő kultúra esetén	Ajánlott léghőmérséklet kezeléskor (Celsius fok)	Eső után hány nappal használható (nap)	Ajánlott adjuváns	Egyéb megjegyzés	Adatközlő (vastagon szedett készítményre vonatkozóan)
bentazon	Basagran 480 SL Basagran, Paine, Agrichem Bentazon, Troy 480, Benta 480 SL, Bentaki	2 l/ha	poszt (a szója 12 cm-es állapotáig)	25 C feletti kezelésnél perzselést okozhat		< 25	2-3			BASF Hungary Kft.
bentazon + imazamox	Corum	1,9 l/ha	poszt (2 - 8 leveles állapotban)	25 C feletti kezelésnél perzselést okozhat. Kezelés után bekövetkező lehűlésnél a tenyészőcsúcs kisárgulása.	A kezelt terület kiszántása esetén csak pillangós kultúra vethető. A kezelt területre 12 hónapig repce és cukorrépa nem vethető.	< 25	2-3	Dash HC		BASF Hungary Kft.
cikloxidim	Focus Ultra	3-4 l/ha	poszt				1-2			BASF Hungary Kft.
imazamox	Pulsar 40 SL , Listego, Press, Puls, Pulsar 40	1 l/ha	poszt (2 - 8 leveles állapotban)	25 C feletti kezelésnél perzselést okozhat. Kezelés után bekövetkező lehűlésnél a tenyészőcsúcs kisárgulása.	A kezelt terület kiszántása esetén csak pillangós kultúra vethető. A kezelt területre 12 hónapig repce és cukorrépa nem vethető.	< 25	2-3			BASF Hungary Kft.
propaquizafop	Agil 100 EC , Aladin	0,6-1,5 l/ha								nem érkezett adat
quizalofop-P	Pantera 40 EC , Rango, Gramin, Targa Super, Leopard, Leopard 5 EC, Attrade Quiazofop Super EC	0,8-3,5 l/ha	poszt (2 leveles állapottól - sorzáródásig)	nincs	nincs	< 23	1			Arysta Magyarország Kft.
kletodim	Select Super , <u>Select 240 EC*</u> , <u>Centurion 240 EC*</u>	0,6-2,4 l/ha	poszt (2 valódi leveles kortól sorzáródásig)		nincs	< 23	nincs korlátozás	nem szükséges		Arysta Magyarország Kft.
tífenzulfuron-metil	Refine 50 SX	10-15 g/ha	poszt (valódi összetett levél megjelenésétől a gyomok 2-4 leveles korában)		nincs	> 5		Trend 90	N műtrágya adagolás, egyszikű partnerrel keverhető.	DuPont Magyarország Kft.

(A * csillaggal jelölt és aláhúzott készítmények hatóanyag koncentrációjában a nem jelölt készítményekhez képest eltérés van!)